

Indicazioni per miscugli da utilizzare per colture a perdere

Tipologia	Unità di misura (kg/ha)	Periodo di semina	Utilità
Panico/Grano, Cavolo/Rapa da foraggio	20-30	aprile-settembre	Alimentazione verde, rifugio
Favino, Avena, Veccia	90-100	settembre-ottobre	Favorire la presenza di insetti, alimentazione verde invernale
Erba medica, Trifoglio, Erba mazzolina	15-20	marzo	Alimentazione, sito nidificazione, favorire presenza insetti
Erba medica, Panico/Miglio	18-22	marzo-aprile	Alimentazione, sito nidificazione, favorire presenza insetti
Mais, Miglio/Panico	20-22	aprile-maggio	Alimentazione
Erba mazzolina, Trifoglio, Lupinella	100-120	aprile	Alimentazione, sito nidificazione, favorire presenza insetti
Grano/Avena/Orzo, Trifoglio/Erba medica	90-120	aprile-settembre	Alimentazione verde, favorire presenza insetti
Segale, Veccia, Panico	15-20	maggio	Alimentazione, rifugio
Sulla/Trifoglio, Favino/Veccia	60-70	periodo autunnale	Alimentazione verde, favorire presenza insetti
Mais, Girasole, Sorgo/Saggina	30	periodo primaverile	Alimentazione
Grano/Avena/Orzo, Veccia/Favino/Pisello	90-100	fine settembre	Alimentazione verde invernale, rifugio

I miscugli possono variare, in tipologia e quantità, in base al contesto in cui vengono seminati